



BOLETÍN INFORMATIVO

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE ALAVA

SERVICIO DE FARMACIA

NÚMERO: 1

CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE
CÁPSULAS Y COMPRIMIDOS





En la siguiente tabla se indica cómo se han de administrar y si interfieren o no con alimentos, *los comprimidos y cápsulas de los medicamentos que disponemos en la actualidad en el Servicio de Farmacia.*

Las formas farmacéuticas que **NUNCA SE DEBEN TRITURAR NI FRACCIONAR, AUNQUE LLEVEN RANURA**, son las siguientes:

- ◆ FORMAS FARMACÉUTICAS DE **LIBERACIÓN RETARDADA**

- ◆ FORMAS FARMACÉUTICAS DE **CUBIERTA ENTÉRICA**

- ◆ FORMAS FARMACÉUTICAS **SUBLINGUALES O BUCALES**

Si se ha de administrar algún medicamento por sonda nasogástrica (SN) se recomienda usar formas farmacéuticas líquidas. Sólo si no existe alternativa disponible se puede plantear la posibilidad de triturar los comprimidos o abrir las cápsulas, pero siempre confirmando que no esté contraindicado (consultad con farmacia ante cualquier duda).

La técnica a seguir para la administración por SN sería pulverizar finamente la forma farmacéutica y diluir el polvo con 15 ml de agua, lavando la sonda con 30 ml de agua, antes y después de la administración. La manipulación de las formas farmacéuticas debe realizarse inmediatamente antes de administrarse y siempre en condiciones asépticas.

Cuando se administren varios fármacos al mismo tiempo, se recomienda que se haga por separado, lavando la sonda con 20-30 ml de agua antes de administrar el siguiente.

Farmacéutica
Vitoria-Gasteiz, 5 de Abril de 2000



Bibliografía

- Olga Delgado, Francesc Puigventos y Joan Serra. Administración de medicamentos por vía oral. Med Clin 97;108:426-435.
- Administración Oral de Medicamentos. Guía Práctica. 1996. Servicio de Farmacia Hospital Juan Canalejo. La Coruña.
- Guía para la administración de medicamentos 1997. Ed EIA. Servicio de Farmacia Hospital Severo Ochoa. Madrid